





Bocian czarny

- W przeciwieństwie do białego, bocian czarny gnieździ się z dala od człowieka.
- Na terenie typowym dla niego środowiskiem są rozległe, wilgotne lasy w pobliżu bagien lub zbiorników wodnych. Najchętniej wybiera podmokłe lasy szuwalne (olsy).
- Gniazdo białego czarnego ma ponad 1 m średnicy. Najczęściej umieszczone jest w dolnej części korony starego drzewa (dębu, sosny, olszy), na grubej, poziomej gałęzi lub w rozwidleniu gałęzi.
- Żywi się zabarni, rybarzami (m.in. płaskorze, szczupaki, płocie, pstrągi), jaski owadami lub ślimakami.

lekcy → bezpośredni
przenosi) drzewa
? do Księgi





Stawowy

Błotniak Stawowy to drapieżny ptak z gatunku Jastrzębiowatych. Dorastają do 56 cm długości ciała oraz do 130 cm rozpiętości skrzydeł, samice dorastają do 0,6 kg natomiast samce do 0,7 kg. U Błotniaków Stawowych występuje jeden lęg w roku, w którym składają od trzech do sześciu jaj.









Błotniak Stawowy

Błotniak Stawowy to drapieżny ptak z gatunku Jastrzębiowatych. Dorasta do 56 cm długości ciała o do 130 cm rozpiętości skrzydeł, samice dorastają do 0,6 kg natomiast samce do 0,7 kg. U Błotniaków Stawowych występuje jeden lęg w roku, w którym składają od trzech do sześciu jaj.